

Descripción Muestra

Informe

ENFERMEDAD MINIMA RESIDUAL N° 2 26/05/26 CF-1169-26

MIELOBLASTOS 20,25 %

MONOCITOS 42,13 %

NEUTROFILOS 9,9 %

EOSINÓFILOS 0,08 %

LINFOCITOS TOTALES 16,7 %

MASTOCITOS 0,03 %

ERITROIDE 10,19 %

VIABILIDAD 70 %

COMENTARIO:

En la muestra recibida de médula ósea se detecta un 20,25% de células inmaduras patológicas de características mieloides, positivo para CD45+deb, CD13+hom, CD117++, HLADR-/+++het, CD34-/++het, negativo a: CD16-, CD64++, CD35-, CD14++, IREM-2++, CD10-, CD11b++.

Se detectan incremento de la línea Monocítica (42,13%)(vn 2-6,5%), eritroide (10,19%)(vn 2-9%), y disminución de la línea Granulocítica (9,9%)(vn 57-80%), con bloqueos/asincronismos madurativos en las curvas Granulocítica/Monocítica: CD13/CD11b, HLADR/CD117, CD10/CD16, CD64/CD35, IREM-2/CD14, CD35/CD14, CD64/CD14.

CONCLUSIÓN:

ENFERMEDAD RESIDUAL DETECTABLE EN 12'000,000 DE EVENTOS TOTALES ANALIZADOS. MUESTRA DE MÉDULA ÓSEA CON PRESENCIA DE CÉLULAS INMADURAS MIELOIDES PATOLÓGICAS EN UN 20,25% CON ORIENTACIÓN HACIA MONOCITOS, EN EL TOTAL CELULAR EVALUADO.

SE SUGIERE REALIZAR ESTUDIOS MOLECULARES DE: T(8;21)(RUNX1), BCR-ABL1, CEBPA, FLT3-ITD, WT1

NOTA: La interpretación del presente resultado requiere la correlación de los datos de la historia clínica, enfermedad de base, mielograma y otros exámenes complementarios del paciente.

Observación

Nota Aclaratoria